



**MEDIKAMENTE**

- L-ADRENALIN® (1:10.000 Lösung) 0,1 ml/kg, iv./io.
- AMIODARON 5 mg/kg, iv./io.

**WÄHREND REANIMATION**

- Optimale CPR (Frequenz, Tiefe, Entlastung)
- Maßnahmen planen bevor CPR-Unterbrechung
- Sauerstoffgabe (12-15l/Min.)
- Gefäßzugang (intravenös, intraossär)
- Invasives Atemwegsmanagement und Kapnographie erwägen
- Nach Intubation ununterbrochene Thoraxkompressionen
- Reversible Ursachen beheben

**REVERSIBLE URSACHEN**

- **H - HYPOXIE**
- **H - HYPOVOLÄMIE**
- **H - HYPO-/HYPERKALIÄMIE/METABOLISCHE STÖRUNGEN**
- **H - HYPOTHERMIE**
- **H - HERZBEUTELTAMPONADE**
- **I - INTOXIKATION**
- **T - THROMBOEMBOLIE**
- **S - SPANNUNGSPNEUMOTHORAX**

**POST CARDIAC ARREST MASSNAHMEN**

- Re-Evaluation (ABCDE)
- Kontrollierte Sauerstoffgabe und Beatmung
- Weiterführende Diagnostik
- Ursachen behandeln
- Temperaturkontrolle

Modifiziert nach den Guidelines des European Resuscitation Council 2015. SIMCharacters Training GmbH übernimmt keine Haftung. © SIMCharacters Training GmbH